

Prospect: Informații pentru utilizator

Fleraday 250 mg, comprimate filmate

Fleraday 500 mg, comprimate filmate

Levofloxacină

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră..

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi punctul 4.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Fleraday comprimate filmate și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Fleraday comprimate filmate
3. Cum să utilizați Fleraday comprimate filmate
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Fleraday comprimate filmate
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Fleraday comprimate filmate și pentru ce se utilizează

Numele medicamentului dumneavoastră este Fleraday comprimate filmate. Fleraday comprimate filmate conține o substanță activă denumită levofloxacină. Aceasta aparține unui grup de medicamente denumit antibiotice.

Levofloxacină este un antibiotic din clasa „chinolonelor”. Aceasta acționează prin omorârea bacteriilor care provoacă infecții în organismul dumneavoastră.

Fleraday poate fi utilizat pentru tratamentul infecțiilor:

- Sinusurilor
- Plămânilor, la persoanele cu probleme de lungă durată cu respirația sau pneumonie
- Tractului urinar, inclusiv ale rinichilor sau ale vezicii urinare
- Prostataei, atunci când aveți o infecție de lungă durată
- Pielii și țesuturilor de sub piele, inclusiv ale mușchilor. Acestea sunt numite uneori „țesuturi moi”.

În anumite situații speciale, Fleraday comprimate filmate poate fi utilizat pentru a scădea probabilitatea de apariție a unei boli pulmonare denumită antrax sau de agravare a bolii, după ce ați fost expus la bacteria care provoacă antraxul.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Fleraday comprimate filmate

Nu utilizați acest medicament și spuneți medicului dumneavoastră dacă:

- Sunteți alergic la levofloxacină, la oricare alt antibiotic chinolonic, cum sunt moxifloxacină, ciprofloxacină sau ofloxacină, sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).
Semnele unei reacții alergice includ: erupție trecătoare pe piele, dificultăți la înghițire sau în respirație, umflare a buzelor, feței, gâtului sau limbii.
- Ați avut vreodată epilepsie.
- Ați avut vreodată o problemă cu tendoanele, cum este tendinita, care a apărut în urma tratamentului cu un „antibiotic chinolonic”. Tendonul este o coardă care leagă mușchiul de scheletul dumneavoastră.
- Sunteți copil sau adolescent în perioada de creștere.
- Sunteți gravidă, credeți că ați putea fi sau dacă încercați să rămâneți gravidă.
- Alăptați .

Nu utilizați acest medicament dacă vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus. Dacă nu sunteți sigur, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să luați Fleraday comprimate filmate.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați medicamentul dumneavoastră, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă:

- Aveți vârsta de 60 de ani sau peste.
- Utilizați corticosteroizi, denumiți uneori steroizi (vezi punctul “Fleraday comprimate filmate împreună cu alte medicamente”).
- Ați avut vreodată o criză convulsivă (convulsie).
- Ați avut leziuni ale creierului determinate de un accident vascular cerebral sau alte leziuni ale creierului.
- Aveți probleme cu rinichii.
- Aveți o afecțiune cunoscută sub numele de „deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază. Sunteți mai predispus la apariția unor probleme grave de sânge atunci când utilizați acest medicament.
- Ați avut vreodată probleme de sănătate mintală.
- Ați avut vreodată probleme cu inima : este necesară precauție atunci când utilizați acest fel de medicamente, dacă v-ați născut cu sau aveți istoric în familie de prelungire a intervalului QT (observată pe ECG, o înregistrare a activității electrice a inimii), aveți un dezechilibru al sărurilor din sânge (în special valori scăzute ale potasiului sau magneziului în sânge), aveți un ritm al inimii foarte lent (denumit „bradicardie”), aveți inima slăbită (insuficiență cardiacă), aveți istoric de atac de cord (infarct miocardic), sunteți femeie sau vârstnic sau luați alte medicamente care determină modificări anormale ale ECG (vezi punctul ”Fleraday comprimate filmate împreună cu alte medicamente”).
- Aveți diabet zaharat.
- Ați avut vreodată probleme cu ficatul.
- Aveți miastenia gravis.

Dacă nu sunteți sigur că vă aflați în oricare dintre situațiile enumerate mai sus, discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul înainte să utilizați Fleraday comprimate filmate.

Fleraday comprimate filmate împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente. Aceasta deoarece Fleraday comprimate filmate poate afecta modul în care acționează alte medicamente. De asemenea, alte medicamente pot afecta modul în care acționează Fleraday comprimate filmate.

În special, spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați oricare dintre următoarele medicamente, deoarece acestea pot crește probabilitatea de apariție a reacțiilor adverse, atunci când sunt utilizate împreună cu Fleraday comprimate filmate:

- Corticosteroizi, denumiți uneori steroizi – utilizați în tratamentul inflamației. Sunteți mai predispuși la inflamația și/sau ruperea tendoanelor .
- Warfarină – utilizată pentru subțierea sângelui. Sunteți mai predispuși la sângerări. Poate fi nevoie ca medicul dumneavoastră să vă efectueze periodic teste de sânge pentru a verifica cât de bine se coagulează sângele dumneavoastră.
- Teofilină – utilizată în tratamentul problemelor respiratorii. Dacă acest medicament este luat împreună cu Fleraday comprimate filmate, sunteți mai predispuși la a avea o criză convulsivă (convulsie).
- Medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) – utilizate în tratamentul durerii și inflamației, cum sunt aspirina, ibuprofenul, fenbufenul, ketoprofenul și indometacina. Dacă aceste medicamente sunt luate împreună cu Fleraday comprimate filmate, sunteți mai predispuși la a avea o criză convulsivă (convulsie).
- Ciclosporină – utilizată după transplantul de organe. Se poate să fiți mai predispuși la apariția reacțiilor adverse ale ciclosporinei.
- Medicamente despre care se știe că afectează modul în care bate inima dumneavoastră. Acestea includ medicamentele utilizate în tratamentul ritmului anormal al inimii (medicamente antiaritmice, cum sunt chinidina, hidrochinidina, disopiramida, sotalol, dofetilida, ibutilida și amiodarona), depresiei (medicamente antidepressive triciclice, cum sunt amitriptilina și imipramina), tulburărilor psihice (medicamente antipsihotice) și infecțiilor bacteriene (antibiotice „macrolide”, cum sunt eritromicina, azitromicina și claritromicina).
- Probenecid – utilizat în tratamentul gutei. Dacă aveți probleme cu rinichii, medicul dumneavoastră va dori să vă administreze o doză mai mică.
- Cimetidina – utilizată în tratamentul ulcerelor și senzației de arsură în capul pieptului. Dacă aveți probleme cu rinichii, medicul dumneavoastră va dori să vă administreze o doză mai mică.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă vreuna din situațiile de mai sus se aplică la dumneavoastră.

Nu utilizați Fleraday comprimate filmate în același timp cu următoarele medicamente. Aceasta deoarece pot afecta modul în care acționează Fleraday comprimate filmate:

- Comprimate cu fier (pentru anemie), suplimente cu zinc, antiacide care conțin magneziu sau aluminiu (pentru aciditate sau senzație de arsură în capul pieptului), didanozină sau sucralfat (pentru ulcer de stomac). Vezi, mai jos, punctul 3 „Dacă utilizați deja comprimate cu fier, suplimente cu zinc, antiacide, didanozină sau sucralfat”.

Teste de urină pentru depistarea opioizilor

La pacienții cărora li se administrează Fleraday comprimate filmate, testele de urină pot da rezultate „fals pozitive” pentru medicamentele utilizate împotriva durerii puternice, denumite „opioide”. Dacă medicul dumneavoastră intenționează să vă efectueze o analiză a urinei, spuneți-i că sunteți în tratament cu Fleraday comprimate filmate.

Teste pentru tuberculoză

Acest medicament poate determina rezultate „fals-negative” la anumite teste de laborator utilizate pentru depistarea bacteriei care provoacă tuberculoză.

Sarcina și alăptarea

Nu utilizați acest medicament dacă:

- Sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau credeți că puteți fi gravidă
- Alăptați sau urmează să alăptați.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

După ce utilizați acest medicament, pot apărea reacții adverse, inclusiv amețeli, somnolență, senzație de învârtire (vertij) sau tulburări de vedere. Unele dintre aceste reacții adverse vă pot afecta capacitatea de concentrare și viteza de reacție. Dacă acestea se întâmplă, nu conduceți vehicule sau nu întreprindeți nicio activitate care necesită un nivel ridicat de atenție.

3. Cum să utilizați Fleraday comprimate filmate

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Întrebați medicul sau farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Cum să utilizați acest medicament

- Luați acest medicament pe cale orală.
- Înghițiți comprimatele întregi, cu un pahar cu apă.
- Comprimatele pot fi luate în timpul meselor sau oricând între mese.

Dacă utilizați deja comprimate care conțin fier, suplimente de zinc, antiacide, didanozină sau sucralfat

- Nu utilizați aceste medicamente în același timp cu Fleraday comprimate filmate. Luați-vă doza din aceste medicamente cu cel puțin 2 ore înainte sau după cel puțin 2 ore de la administrarea Fleraday comprimate filmate.

Cât trebuie să utilizați

- Medicul dumneavoastră va decide câte comprimate de Fleraday comprimate filmate trebuie să luați.
- Doza va depinde de tipul infecției și de localizarea infecției în organismul dumneavoastră.
- Durata tratamentului dumneavoastră va depinde de cât de gravă este infecția dumneavoastră.
- Dacă simțiți că efectul medicamentului este prea slab sau prea puternic, nu modificați singuri doza, ci întrebați-l pe medicul dumneavoastră.

Adulți și vârstnici

Infecții ale sinusurilor

- Două comprimate Fleraday 250 mg o dată pe zi, în fiecare zi
- Sau, un comprimat Flerday 500 mg o dată pe zi, în fiecare zi

Infecții ale plămânilor, la persoanele cu probleme de lungă durată în respirație

- Două comprimate Fleraday 250 mg o dată pe zi, în fiecare zi
- Sau, un comprimat Flerday 500 mg o dată pe zi, în fiecare zi

Pneumonie

- Două comprimate Fleraday 250 mg o dată sau de două ori pe zi, în fiecare zi
- Sau, un comprimat Fleraday 500 mg o dată sau de două ori pe zi, în fiecare zi

Infecții ale tractului urinar, inclusiv ale rinichilor sau vezicii urinare

- Unu sau două comprimate Fleraday 250 mg o dată pe zi, în fiecare zi
- Sau, ½ de comprimat sau un comprimat de Fleraday 500 mg o dată pe zi, în fiecare zi

Infecții ale prostatei

- Două comprimate de Fleraday 250 mg o dată pe zi, în fiecare zi
- Sau, un comprimat de Fleraday 500 mg o dată pe zi, în fiecare zi

Infecții ale pielii și țesuturilor de sub piele, inclusiv ale mușchilor

- Două comprimate Fleraday 250 mg o dată sau de două ori pe zi, în fiecare zi
- Sau, un comprimat de Fleraday 500 mg o dată sau de două ori pe zi, în fiecare zi

Adulți și vârstnici cu probleme cu rinichii

Poate fi necesar ca medicul dumneavoastră să vă administreze o doză mai mică.

Copii și adolescenți

Acest medicament nu trebuie administrat la copii și adolescenți.

Protejați-vă pielea de lumina soarelui

Feriți-vă de expunerea directă la lumina soarelui cât timp luați acest medicament și timp de 2 zile după ce opriți administrarea sa, deoarece pielea dumneavoastră va deveni mult mai sensibilă la soare și pot apărea arsuri, furnicături sau erupție severă cu vezicule, dacă nu vă luați următoarele măsuri de precauție:

- Asigurați-vă că utilizați cremă cu factor ridicat de protecție solară
- Purtați întotdeauna pălărie și haine care vă acoperă brațele și picioarele
- Evitați solarul

Dacă utilizați mai mult Fleradaycomprimate filmate decât trebuie

Dacă utilizați accidental mai multe comprimate decât trebuie, spuneți imediat unui medic sau cereți imediat alt sfat medical. Luați ambalajul medicamentului cu dumneavoastră, pentru ca medicul să știe ce ați luat. Pot să apară următoarele reacții: crize convulsive (convulsii), confuzie, amețeli, afectarea stării de conștiență, tremor și probleme la nivelul inimii – care duc la bătăi neregulate ale inimii, precum și senzație de rău (greață) sau senzație de arsură la nivelul stomacului.

Dacă uitați să utilizați Fleradaycomprimate filmate

Dacă uitați să luați o doză, luați-o imediat ce vă aduceți aminte, cu excepția cazului în care este în apropierea momentului în care trebuie să luați următoarea doză. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetați să utilizați Fleradaycomprimate filmate

Nu încetați să luați Fleraday comprimate filmate doar pentru că vă simțiți mai bine. Este important să terminați schema de tratament pe care v-a prescris-o medicul dumneavoastră. Dacă încetați să utilizați comprimatele prea devreme, infecția poate reapărea, starea dumneavoastră se poate agrava sau bacteria poate deveni rezistentă la medicament.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că acestea nu apar la toate persoanele. Aceste reacții sunt de obicei ușoare sau moderate și dispar adesea după o perioadă scurtă de timp.

Întrerupeți tratamentul cu Fleraday comprimate filmate și adresați-vă imediat unui medic sau mergeți imediat la un spital dacă observați următoarea reacție adversă:

Foarte rare (afectează până la 1 utilizator din 10000)

- Aveți o reacție alergică. Semnele pot include: erupție pe piele, dificultăți la înghițire sau în respirație, umflare a buzelor, feței, gâtului sau limbii.

Întrerupeți tratamentul cu Fleraday comprimate filmate și adresați-vă imediat unui medic dacă observați următoarele reacții adverse grave – este posibil să aveți nevoie de tratament medical de urgență:

Rare (afectează până la 1 utilizator din 1000)

- Diaree apoasă, care poate conține sânge, posibil însoțită de crampe la nivelul stomacului și temperatură crescută. Acestea pot fi semne ale unei probleme severe la nivelul intestinului.
- Durere și inflamare a tendoanelor sau ligamentelor, care poate duce la ruptură. Tendonul lui Ahile este afectat de cele mai multe ori.
- Crize convulsive (convulsii).

Foarte rare (afectează până la 1 utilizator din 10000)

- Senzație de arsură, furnicături, durere sau amorțeală. Acestea pot fi semne a ceea ce se numește „neuropatie”.

Cu frecvență necunoscută (frecvența nu poate fi estimată din datele disponibile)

- Erupții severe pe piele, care pot include apariția de vezicule sau cojirea pielii în jurul buzelor, ochilor, gurii, nasului și organelor genitale.
- Pierdere a poftei de mâncare, îngălbenire a pielii și ochilor, urină închisă la culoare, mâncărimi sau sensibilitate la nivelul stomacului (abdomenului). Acestea pot fi semne ale unor probleme la nivelul ficatului, care pot include insuficiență letală a ficatului.

Dacă vă este afectată vederea sau dacă aveți oricare alte tulburări la nivelul ochilor în timpul tratamentului cu Fleraday comprimate filmate, consultați imediat un medic oftalmolog.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre următoarele reacții adverse devine gravă sau durează mai mult decât câteva zile:

Frecvente (afectează până la 1 utilizator din 10)

- Probleme cu somnul.
- Dureri de cap, amețeli.
- Senzație de rău (greață, vărsături) și diaree.
- Creșterea a valorilor unor enzime ale ficatului în sânge.

Mai puțin frecvente (afectează până la 1 utilizator din 100)

- Modificări ale numărului altor bacterii sau ciuperci, infecție cu o ciupercă denumită Candida, care poate necesita tratament.
- Modificări ale numărului celulelor albe din sânge, apărute în rezultatele unor analize de sânge (leucopenie, eozinofilie).
- Stare de stres (anxietate), confuzie, nervozitate, somnolență, tremurături, senzație de învârtire (vertij).
- Senzație de lipsă de aer (dispnee).
- Modificările ale gustului, pierderea poftei de mâncare, disconfort la nivelul stomacului sau indigestie (dispepsie), dureri în zona stomacului, senzație de balonare (flatulență) sau constipație.

- Măncărimi și erupții pe piele, măncărimi severe sau blânde (urticarie), transpirație abundentă (hiperhidroză).
- Dureri la nivelul articulațiilor sau la nivelul mușchilor.
- Testele de sânge pot avea rezultate anormale, din cauza problemelor cu ficatul (creșterea bilirubinei) sau cu rinichii (creșterea creatininei).
- Stare generală de slăbiciune.

Rare (afectează până la 1 utilizator din 1000)

- Apariție cu ușurință de vânătăi sau sângerare, din cauza scăderii numărului de plachete din sânge (trombocitopenie).
- Număr scăzut de celule albe în sânge (neutropenie).
- Răspuns imun exagerat (hipersensibilitate).
- Scădere a valorilor zahărului din sângele dumneavoastră (hipoglicemie). Aceasta este important de știut pentru persoanele cu diabet zaharat.
- Vedere sau auzire a unor lucruri care nu există (halucinații, paranoia), schimbări de opinie și de gândire (reacții psihotice), cu risc de a avea gânduri sau acțiuni de sinucidere.
- Stare de depresie, probleme mintale, stare de neliniște (agitație), vise anormale sau coșmaruri.
- Senzație de furnicături la nivelul mâinilor și picioarelor (parestezii).
- Probleme cu auzul (tinitus) sau cu vederea (vedere încețoșată).
- Bătăi anormal de rapide ale inimii (tahicardie) sau tensiune arterială scăzută (hipotensiune arterială).
- Slăbiciune musculară. Aceasta este important de știut pentru persoanele cu miastenia gravis (o boală rară a sistemului nervos).
- Modificări ale modului în care funcționează rinichii dumneavoastră și, ocazional, insuficiență renală, care poate fi cauzată de o reacție alergică la nivelul rinichilor, denumită nefrită interstițială.
- Febră.

Cu frecvență necunoscută (frecvența care nu poate fi estimată din datele disponibile)

- Scădere a numărului de celule roșii din sânge (anemie): aceasta poate să vă facă pielea palidă sau galbenă din cauza distrugerii celulelor roșii din sânge; scădere a numărului tuturor tipurilor de celule din sânge (pancitopenie).
- Febră, inflamație în gât și stare generală de rău, care nu trece. Acestea pot fi provocate de o scădere a numărului celulelor albe din sânge (agranulocitoză).
- Scădere importantă a circulației sângelui (șoc asemănător celui anafilactic).
- Creștere a valorilor zahărului din sânge (hiperglicemie) sau scădere a valorilor zahărului din sânge, care duce la apariția comei (comă hipoglicemică). Acestea sunt important de știut pentru persoanele cu diabet zaharat.
- Modificări ale mirosului, pierdere a mirosului sau gustului (parosmie, anosmie, ageuzie).
- Probleme de mișcare și mers (dischinezie, tulburări extrapiramidale).
- Pierdere temporară a conștienței sau cădere (sincopă).
- Pierdere temporară a vederii.
- Afectare sau pierdere a auzului.
- Ritm anormal de rapid al bătăilor inimii, ritm neregulat al bătăilor inimii care pune viața în pericol, inclusiv stop cardiac, afectare a ritmului inimii (denumită „prelungirea intervalului QT”, observată pe ECG, o înregistrare a activității electrice a inimii).
- Dificultate în respirație sau respirație șuierătoare (bronhospasm).
- Reacții alergice pulmonare.
- Pancreatită.
- Inflamare a ficatului (hepatită).
- Creștere a sensibilității pielii dumneavoastră la soare și la lumina ultravioletă (fotosensibilitate).

- Inflamare a vaselor care transportă sângele prin organismul dumneavoastră, din cauza unei reacții alergice (vasculită).
- Inflamare a țesuturilor din interiorul gurii (stomatită).
- Ruptură a mușchilor sau distrugere a mușchilor (rabdomioliză).
- Îmroșire și umflare a articulațiilor (artrită).
- Durere, inclusiv dureri de spate, în piept și la nivelul extremităților.
- Crize de porfirie la persoanele care au deja porfirie (o boală metabolică foarte rară).
- Dureri de cap persistente, cu sau fără afectare a vederii (hipertensiune intracraniană benignă).

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Fleraday comprimate filmate

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare, dar este cel mai bine să păstrați comprimatele Fleraday comprimate filmate în folia și cutia originală, într-un loc uscat.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau folie după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele care nu le mai utilizați. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Fleraday comprimate filmate

Substanța activă este levofloxacină.

Un comprimat filmat Fleraday 250 mg conține levofloxacină 250 mg (sub formă de levofloxacină hemihidrat).

Un comprimat filmat Fleraday 500 mg conține levofloxacină 500 mg (sub formă de levofloxacină hemihidrat).

Celelalte componente sunt:

Pentru nucleu: Celuloză microcristalină; amidon de porumb; dioxid de siliciu coloidal anhidru; cros повідonă; hipromeloză; stearil fumarat de sodiu.

Pentru film: Hipromeloză; dioxid de titan [E 171]; Macrogol 400; oxid roșu de fer [E 172]; oxid galben de fer [E 172]; talc.

Cum arată comprimatele Fleraday și conținutul ambalajului

Fleraday sunt comprimate filmate de forma unei capsule de culoarea piersicii, marcate pe o față cu „250” și o linie mediană care separa „2” și „50”, și pe cealaltă față marcat cu „L” și linie mediană.

Fleraday sunt comprimate filmate de forma unei capsule de culoarea piersicii, marcate/ ștanțate pe o față cu „500” și o linie mediană care separa „5” și „00”, și pe cealaltă față marcat/ștanțat cu „L”, și linie mediană.

Comprimatul poate fi divizat în două părți egale.

Comprimatele filmate de 250 mg sunt furnizate în cutii a câte 3, 5, 7 și 10 comprimate.

Comprimatele filmate de 500 mg sunt furnizate în cutii a câte 5, 7 și 10 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Dr. Reddy's Laboratories Romania S.R.L.
Str. Nicolae Caramfil, Nr. 71-73, Etaj 5, Spațiul 10,
Sector 1, București, România

Fabricantul

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd
6 Riverview Road, Beverley, Beverley, East Yorkshire, HU17 OLD, Marea Britanie.

Următoarele medicamente sunt autorizate în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Italia	Levofloxacină Tecnigen 250 mg comprimate rivestite con film Levofloxacină Tecnigen 500 mg comprimate rivestite con film
România	Fleraday 250 mg, comprimate filmate Fleraday 500 mg, comprimate filmate
Marea Britanie	Levofloxacin 250 mg film-coated Tablets Levofloxacin 500 mg film-coated Tablets

Acest prospect a fost revizuit în Martie 2015